



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
TOURAINÉ

Indre-et-Loire


Etat des connaissances en 2019

5ème Rencontre Circaète

Gémenos – 5 et 6 octobre 2019

Pierre Réveillaud – LPO Touraine

Indre-et-Loire – Distribution nationale




Sur la distribution Ouest « Elle s'étend plus au nord dans la vallée de la Loire, du Saumurois à la forêt d'Orléans ».
AONFM 2015 M. Caupenne.

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine : Nidification et présence hivernale (N. Issa & Y. Muller).



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
TOURAINÉ

Indre-et-Loire – Géographie



Source : Wikipédia.



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
TOURAINÉ

Indre-et-Loire – Principaux massifs forestiers



- Confins Bugeois-Touraine : 32 500 ha d'espaces boisés (dont ZPS de Rillé).
- Massif forestier de Chinon : 10 754 ha dont 5 141 ha en domanial.
- Forêt d'Amboise : 6 612 ha.
- Massif forestier de Loches : 5 066 ha (ZPS Champeigne à proximité).

Indre-et-Loire – Paysages fréquents



Historique départemental, statut en région

- **Références sur l'Indre-et-Loire :**


- **1973** : *Témoignage agent ONF « serait nicheur en forêt domaniale de Chinon ».* Comm. pers.
- **1994** : « Deux petits foyers satellites [...] Ils se trouvent vers la boucle de la Loire à Orléans, dans les départements de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de l'Yonne ». **B. Joubert.**
- **2008** : « L'augmentation du nombre de données constatée en 2005 ($n = 30$ pour 32 individus) se confirme avec à la clé la découverte d'un premier nid en forêt de Chinon » par A. Perthuis. **Synthèse du P'tit Grav' 2006, J. Présent.**
- **2011-2012** : ébauche de nid réalisée par des oiseaux immatures en ZPS Champagne (**FDC37**).
- **2015** : La reproduction se résume donc en « Indre-et-Loire, depuis 2006 en forêt de Chinon ». **AONFM 2015, M. Caupenne.**
- **Base de données** : première mention en 1977. Données récurrentes en forêt de Chinon, Rillé.

- **Statut actuel en région Centre-Val de Loire : classé « Vulnérable ».**

- « Une petite centaine de couples nichent dans le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Indre-et-Loire et le Cher (l'Indre en 2014). D'après les effectifs, l'espèce devrait être classée **EN**, mais d'après les tendances (effectifs ont triplé en 10 ans) elle est donc déclassée en **VU** ». **Livre Rouge 2012**



Indre-et-Loire – Distribution départementale



**Jeu de données en période
de repro n = 320
[2015 – 2019]**

n = 37 en 2015

n = 46 en 2016

n = 63 en 2017

n = 74 en 2018

n = 100 en 2019

**Présence récurrente
d'individus adultes sur
une dizaine de sites
identifiés.**

**Les prospections sont à
réaliser en priorité sur
sites Natura2000 et PNR.**



**AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
TOURAINÉ**

Indre-et-Loire – Dates extrêmes.

Dates records historiques (récentes et anciennes) :

- ➔ 2/03/1989 à Langeais
- ➔ 6/03/2010 à Loché sur Indrois
- ➔ 21/10/1983 au Grand-Pressigny
- ← 15/10/2018 à Ballan-Miré

Dates d'arrivée sur les sites de reproduction connus :

- Chinon : 26/03/2017
- Richelais : première quinzaine d'avril

Parades observées : 7 au 15 avril

Dates d'arrivée sur autres sites suspectés :

- Champeigne : 25/03/2017
- Loches : 26/03/2018
- Rillé : 27/03/2016



Indre-et-Loire – Mentions d'oiseaux immatures



Dates et lieux d'observation (toutes en Champagne) :

- 01/07/2011 & 15/05/2012 : couple d'immatures occupant un bois proche de la ZPS (G. Favier, B. Griard).
- 18/05/2018 : âge indéterminé, vu à Bléré (E. Carreau).
- 17/07/2019 : 2A ou 3A, vole en compagnie d'un adulte à Dolus-le-Sec, durant les déchaumages (P. Réveillaud).

Cliché : A. Bloquet



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
TOURAINÉ

Cas de reproduction récents



Forêt de Chinon

- 2016 : 1 aire découverte le 26/06 avec envol du jeune estimé mi-août.
- 2017 : nouvelle tentative, oiseau vu couvant le 14/05 et abandon constaté le 18/06 (nid affaissé).
- 2018 : couple revu le 15/04 sur le site, sans preuve de nidification.
- 2019 : pas d'observations.

Cas de reproduction récents



Richelais

2017 : 1 aire découverte le 21/05. Adulte couveur le 25/06 et poussin d'une quinzaine de jours observé le 14/07. Envol du jeune estimé avec précision durant la première décade de septembre !

2018 : aire réinvestie par un couple de buses variables, circaètes toujours présents sur le massif forestier sans preuve de nidification.

2019 : redécouverte d'une aire avec envol du jeune ~ 15/08.

Bilan depuis 2016

- Arbres porteurs : 2 aires sur pin sylvestre et 1 aire sur pin maritime.
- Distances connues sur territoire de chasse 
 - Richelais : 8,5 km (rayonne en moyenne sur 5 km).
 - Chinon : 4-5 km.



- Temps bénévole / productivité :
 - 2016 : 3 jours (1 cple suivi) = 1 nid occupé produisant 1 jeune.
 - 2017 : 5 jours (2,5 j / cple) = 2 nids occupés : 1 jeune produit et 1 échec.
 - 2018 : 4 jours (2 j / cple) = aucune preuve sur les 2 sites malgré présence.
 - 2019 : 2 jours (1 cple suivi) = 1 nouveau nid occupé produisant un 1 jeune.
- **Estimation du nombre de couples en 37 ??**
 - Une dizaine de couples reproducteurs / territoriaux identifiés.

