

 1,25 à 1,9 m

 0,8 à 0,95 m

 2,9 à 6,6 kg



Adulte

AIGLE

ROYAL



Aquila chrysaetos
FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

Espèce sédentaire nichant dans les reliefs rocheux et principalement en montagne, à une altitude variant de 200 à près de 2 000 mètres. Son nid, construit en falaise ou plus rarement dans un arbre, utilisé pendant des décennies, peut devenir énorme. L'Aigle royal est le plus puissant de nos rapaces et se nourrit principalement de mammifères de taille moyenne, aussi d'oiseaux, de reptiles et, surtout en hiver, de charognes. Sa population est de l'ordre de 390 à 450 couples.



Répartition

Eteint

Menacé

Préoccupation mineure

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Statut de conservation en France (UICN) : **Vulnérable**

 1,25 à 1,35 m

 0,5 à 0,57 m

 0,5 à 1,25 kg



Adulte

AIGLE

BOTTÉ



Morphe sombre



Morphe clair

Aquila pennata
FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

Le plus petit des aigles de France a la particularité de présenter deux plumages très différents : un clair (75 % des individus) et un sombre. Plutôt discret, sauf au moment des parades après la mi-mars, il vit en plaine et collines mais peut s'élever en moyenne montagne. L'alternance de boisements, où il niche, et de zones ouvertes, où il chasse, lui est indispensable. Ses proies sont avant tout des oiseaux de taille petite à moyenne, ensuite des reptiles et des mammifères jusqu'à la taille d'un jeune lapin. Sa reproduction est tardive et les jeunes ne s'envolent que vers la fin juillet, un mois et demi avant leur départ en migration. Sa population est estimée à 585-810 couples.



Répartition

Eteint

Menacé

Préoccupation mineure

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Statut de conservation en France (UICN) : **Quasi menacé**

 1,50 à 1,80 m

 0,65 à 0,72 m

 1,5 à 2 kg



Adulte

AIGLE

DE BONELLI



Aquila fasciata
FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

De taille intermédiaire entre l'Aigle botté et l'Aigle royal, son plumage blanc, de la gorge et du ventre, contraste avec les nuances sombres du dessous des ailes. Le plumage brun du dessus se caractérise par une tache blanche sur le dos. Pourvu d'une vue perçante, de serres puissantes et d'une grande agilité, il capture ses proies en plein vol et au sol. Les oiseaux (héron, goéland, perdrix, pigeon...) représentent 70 % de son régime alimentaire, les mammifères 25 % et les grands lézards (5 %). C'est le rapace le plus menacé de France avec 35 couples répartis dans la région méditerranéenne où il trouve les falaises pour nicher, et les plaines et les reliefs pour chasser.



Répartition

Eteint

Menacé

Préoccupation mineure

EX

EW

CR

EN

VU

NT


LC

Statut de conservation en France (UICN) : **En danger**

 1,45 à 1,70 m

 0,64 m

 1 à 1,4 kg



Adulte

AIGLE

POMARIN



Clanga pomarina
FAMILLE DES ACCIPITRIDÉS

Un seul couple isolé se reproduit dans l'est de la France depuis 2003 et à plus de 600 km de l'aire de reproduction habituelle située en Europe centrale et orientale. Ce couple fréquente une mosaïque de milieux avec des forêts où il niche et des prairies et des zones humides où il se nourrit. Son régime alimentaire se compose essentiellement de petits rongeurs et d'amphibiens. Grande migratrice, l'espèce hiverne en Afrique de l'Est et du Sud.



Répartition

Eteint

Menacé

Préoccupation mineure

EX

EW

CR

EN

VU

NT

LC

Statut de conservation en France (UICN) :

NA (Non Applicable) : espèce non soumise à l'évaluation

Statut de conservation en France (UICN) : **En danger**

LES AIGLES

AIGLE ROYAL

AIGLE BOTTÉ

AIGLE DE BONELLI

AIGLE POMARIN

CIRCAËTE

JEAN-LE-BLANC

BALBUZARD

PÊCHEUR

PYCARGUE À

QUEUE BLANCHE





AGIR pour la BIODIVERSITÉ